

TỪ NHỮNG CHUYÊN GIA SÁNG TẠO RA

**HYGROZYME®**



**HYGROPUNCH™** là sản phẩm thuốc trừ sâu, thuốc diệt ve và thuốc diệt nấm tiếp xúc phổ rộng được chứng nhận OMRI có chứa tinh dầu để kiểm soát và ngăn chặn các loài gây hại như nhện đỏ và rệp, và các bệnh như bệnh phấn trắng. Sản phẩm này đủ điều kiện được miễn đăng ký EPA theo Đạo luật thuốc trừ sâu, thuốc diệt nấm và thuốc diệt chuột liên bang (FIFRA).

**HYGROPUNCH™** được sử dụng cho cây cảnh, rau và cây có hoa trong nhà, các cấu trúc trồng trọt khép kín khác như nhà kính và các ứng dụng ngoài trời.

Các nghiên cứu của bên thứ ba cho thấy việc áp dụng **HYGROPUNCH™** cho cây trồng:

1. bị ảnh hưởng bởi bệnh phấn trắng có thể làm giảm áp lực bệnh lên tới 85%.
2. bị ảnh hưởng bởi nhện đỏ có thể làm giảm số lượng sâu bệnh lên tới 98%.
3. bị ảnh hưởng bởi rệp có thể làm giảm tổng số lượng sâu bệnh lên tới 98%.
4. bị rệp tấn công có thể làm tăng tổng sản lượng lên đến 238% so với đối chứng không được xử lý.

### Ghi chú về ứng dụng:

- ✓ Khoảng thời gian tái nhập không giờ và không ngày sau thu hoạch.
- ✓ An toàn cho cây trồng và môi trường; yêu cầu PPE tối thiểu.
- ✓ Thành phần hoạt tính:  
Dầu đậu nành – 65%  
Dầu quế – 5%  
Dầu cỏ xạ hương – 5%
- ✓ Khuyến cáo chỉ nên sử dụng **HYGROPUNCH™** trong hai tuần đầu tiên của giai đoạn ra hoa với liều lượng tối đa là 1% (38 mL/gallon).

## Hướng dẫn sử dụng:

Sử dụng theo hướng dẫn trên nhãn. Sản phẩm này CHỈ dùng để bón lá. Sản phẩm này là dạng cô đặc có thể nhũ hóa và phải pha loãng với nước trước khi sử dụng.

**CẢNH BÁO:** Không sử dụng sản phẩm này nếu ong hoặc các loài thụ phấn khác đang kiếm ăn trong khu vực xử lý.

Khuyến nghị về liều lượng sử dụng qua lá	
Phòng ngừa	0.5% (19 mL/Gal)
Áp lực bệnh nhẹ hoặc nhiễm trùng	1.0% (38 mL/Gal)
Áp lực bệnh vừa hoặc nhiễm trùng	1.5% (57 mL/Gal)
Áp lực bệnh nặng hoặc nhiễm trùng	2.0% (76 mL/Gal)

*\*Không vượt quá 2% (76 mL/Gal)\**

*Chỉ sử dụng biểu đồ thức ăn này làm hướng dẫn. Tất cả các kết quả đều phụ thuộc vào các yếu tố bên ngoài. Để xác nhận tỷ lệ cho từng lần cho ăn, hãy xem máy tính thức ăn trên [Hygrozyme.com](https://www.hygrozyme.com).*

### Lưu ý:

Đối với việc sử dụng ngoài trời, hãy xịt vào buổi sáng sớm hoặc vào buổi tối khi cây không bị ánh nắng trực tiếp chiếu vào. Đối với việc sử dụng trong nhà, hãy xịt khi nhiệt độ dưới 80°F (khoảng 27°C) với đèn nhân tạo đã tắt, hoặc khi cây không tiếp xúc với ánh sáng trong một khoảng thời gian dài. Do có nhiều loại cây khác nhau có thể phản ứng khác nhau với **HYGROPUNCH™**, hãy thử nghiệm sản phẩm ở quy mô nhỏ trước khi áp dụng trên diện rộng.

### Hướng dẫn pha trộn:

Đổ một nửa lượng nước sạch cần thiết vào một bể sạch. Theo bảng tỷ lệ sử dụng, thêm lượng **HYGROPUNCH™** mong muốn. Đổ đầy lượng nước còn lại vào bình và trộn đều cho đến khi đạt được hỗn hợp đồng nhất.

### Hướng dẫn sử dụng:

Áp dụng dung dịch đã pha loãng như một SPRAY TRÊN LÁ, sử dụng thiết bị xịt tiêu chuẩn sạch sẽ, để đảm bảo phủ đều và hoàn toàn lên bề mặt cây trồng và lá cho đến khi chảy nước. Đối với sự tấn công của côn trùng, hãy đảm bảo phủ đầy đủ (trên và dưới lá) để đạt được kết quả tốt nhất.

### Khả năng tương thích:

Khả năng tương thích hạn chế của hỗn hợp bể chứa **HYGROPUNCH™** với các sản phẩm thường dùng khác đã được đánh giá. Chúng tôi khuyên bạn nên tiến hành thử nghiệm trong lọ đối với hỗn hợp bể chứa với các sản phẩm khác trước khi sử dụng trên diện rộng.

### Bảo quản và thải bỏ:

Bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp. Tránh tiếp xúc với nhiệt độ cao và nhiệt độ quá cao trong thời gian dài. Vứt bỏ nội dung và bao bì theo luật pháp địa phương, khu vực và liên bang.